


TELEOSTEI
Acanthopterygii
Perciformes-Sparidae

Parapristipoma (Pristipoma) viridense

CUVIER & VALENCIENNES 1830



Pristipoma octolineatum. (GUICHENOT. — Poissons Algérie. Pl. 2).

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. — (*Genre Parapristipoma*) (Bleeker. Archives Néerlandaises, VIII, 1872). Sparidaes aux dents toutes coniques, absentes sur le vomer et les palatins. Pas de canines. Prémaxillaires peu protactiles. Menton sans sillon central en arrière de la symphyse maxillaire, des pores. Rayons mous de la dorsale et de l'anale garnis d'écaillés. Anale courte, 7 rayons mous.

Préopercule finement strié. Branchiospines longues et effilées.
Vessie natatoire simple.

CARACTÈRES SPÉCIFIQUES. — **Corps** assez puissant. Sa hauteur est sensiblement égale à la longueur de la tête et comprise trois fois dans la longueur totale. Courbure dorsale modérément élevée.

Coloration. — Olive avec quatre bandes étroites bleu-ciel de chaque côté du dos : la plus basse et la plus large étant à la hauteur des yeux. Sur les joues, trace d'une cinquième bande. Nageoires tachées de noir ; parfois entièrement verte mais avec bord noir.

Tête. — Longueur égale au $\frac{1}{3}$ de la longueur totale. Bouche de taille moyenne. Yeux grands, leur diamètre est compris environ $3 \frac{1}{4}$ dans la longueur de la tête. Préorbitaire court. Le maxillaire dépasse la verticale passant par le bord antérieur de l'œil. La mâchoire inférieure est proéminente.

Nageoires. — *Dorsale* : partie épineuse avec 13 rayons courts et grêles, la partie molle également basse, sa longueur étant égale aux $\frac{2}{3}$ de la partie épineuse.

Anale : trois épines, la seconde longue est forte, la troisième sensiblement égale à la seconde et toutes deux plus courtes que les rayons mous qui suivent.

Pectorales courtes. L = 1 fois 1/4 dans longueur de la tête.

Ligne latérale : 80 écailles.

Rayons branchiostèges : 7.

Dorsale : XIII + 14. Anale : III + 7.

Pectorales : 16 ou 17. Ventrales : I + 5.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET BIOLOGIE. — Côte Nord-Ouest d'Afrique et îles environnantes. Côte Sud d'Espagne, Méditerranée (rare).

SYNONYMIE, BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, OUVRAGES PRINCIPAUX

1830. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poissons. V. 287. (*Pristipoma viridense.*)

1859. — GUNTHER. Catalogue, p. 302. (*Pristipoma viridense.*)

1835. — VALENCIENNES. Hist. Nat. Iles Canaries, p. 26. (*Pristipoma viridense.*)

1833. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poissons. IX, 483. (*Pristipoma otolineatum.*)

1850. — GUICHENOT. Poissons Algérie, p. 42. Pl. 2. (*Pristipoma octolineatum.*)

1893. — D. S. JORDAN et B. FESLER. Sparoid Fishes America of Europe. Rep. U. S. Commis. Fish and Fisheries, 1893, pp. 421-524. (*Parapristipoma viridense.*)

Jean LE GALL, 1933.