



**DIAGNOSE** — Coquille de forme conique, peu élevée, à sommet légèrement antérieur, à base plus ou moins distinctement hexagonale ou heptagonale. Test assez mince. Sculpture composée de nombreuses stries rayonnantes, sensiblement inégales, légèrement ondulées, et de lignes d'accroissement concentriques. Péristome tranchant, à bord festonné. Coloration externe variant du roux au gris plus ou moins olivâtre. Face interne d'un gris luisant, irisée de reflets bleuâtres, obscurément rayonnée de gris plus foncé. Hauteur : 10 à 12 mm. ; longueur : 30 à 40 mm. ; largeur : 25 à 35 mm.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE** — Ce mollusque ne vit que dans la Méditerranée où il est abondant sur les rochers de la zone littorale.

Nom vulgaire : Arapède.

**BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE**  
**OUVRAGES PRINCIPAUX**

1758. — LINNÉ, Systema Natura, ed. X, p. 782 (*Patella cærulea*).  
 1780. — BORN, Testacea Musei Cæsarei Vindobonensis, p. 419, pl. 18, fig. 2 (*P. cærulea* L.).  
 1854. — REEVE, Conchologia Iconica, VIII, *Patella*, pl. 28, fig. a-b (*P. cærulea* L.).  
 1870. — HIDALGO, Moluscos marinos de España, pl. 50, fig. 5-6 et pl. 51, fig. 1-2 (*P. cærulea* L.).  
 1886. — BUCQUOY, DAUTZENBERG, DOLLFUS, Mollusques marins du Roussillon, 1, p. 471, pl. LVIII, fig. 1-7 (*P. cærulea* L.).  
 1897. — DAUTZENBERG, Atlas de poche des Coquilles des côtes de France, pl. 29, fig. 110 (*P. cærulea* L.).

ED. LAMY-1928