



DIAGNOSE — Coquille ovale allongée, assez solide, peu renflée, presque équilatérale, subéquivalve.

Valve gauche à peine plus convexe, ornée d'une trentaine de côtes rayonnantes, à peu près égales aux intervalles qui les séparent, arrondies et garnies de squamules imbriquées, parfois très développées; oreillettes très inégales, la postérieure petite, triangulaire, obliquement tronquée, l'antérieure grande à contour externe faiblement sinueux.

Valve droite presque aussi convexe, avec sculpture semblable; oreillettes très inégales la postérieure petite, triangulaire, obliquement tronquée, l'antérieure grande, munie d'une échancrure byssale large, profonde, denticulée à sa base.

Coloration tout au plus un peu moins vive sur la valve droite que sur la gauche, et très variable, le plus souvent d'un rouge brique terne, mais pouvant offrir un ton rose, fauve clair, jaune paille, orangé, vermillon, brun, violet plus ou moins foncé, tantôt uni, tantôt diversement tacheté de blanc, ou même être entièrement blanche.

Bord cardinal muni, au centre, d'une grande fossette ligamentaire, triangulaire.

Diamètre umbono-ventral : 50 à 55 millimètres ; diamètre antéro-postérieur : 35 à 45 millimètres ; épaisseur : 14 à 16 millimètres.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée : toutes les zones (jusqu'à 70 mètres de profondeur).

Les exemplaires Méditerranéens atteignent une taille plus grande et sont ordinairement pourvus d'aspérités plus fortes.

Noms vulgaires : Pétoncle, Petite Vanne.

**BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE
OUVRAGES PRINCIPAUX**

1758. — LINNÉ, Systema Naturæ, ed. X, p. 698 (*Ostrea varia*).
1784. — CHEMNITZ, Conchylien-Cabinet, VII, p. 331, pl. 66, fig. 633-634 (*Pecten varius L.*).
1853. — REEVE, Conchologia Iconica, VIII, *Pecten*, pl. XXV, fig. 102 a-b (*Pecten varius L.*).
1870. — HIDALGO, Moluscos marinos de España, p. 121, pl. 35, fig. 1-5 et pl. 35 A, fig. 1-2 (*Pecten varius L.*).
1889. — BUCQUOY, DAUTZENBERG, DOLLFUS, Mollusques marins du Roussillon, II, p. 99, pl. XV, fig. 1-8 (*Pecten varius L.*).
1897. — DAUTZENBERG, Atlas de poche des Coquilles des côtes de France, pl. 34, fig. 123 (*Chlamys varia L.*).

ED. LAMY 1930.