


TELEOSTEI
Acanthopterygii-Perciformes

Sargus sargus
(LINNÉ 1758)



DIAGNOSE — Dorsale XI à XII - 12 à 15, Anale III - 13 à 14, Caudale 3/17/3, Pectorales 15, Pelviennes I-5 rayons - Ligne latérale 65 à 66 écailles, ligne transversale 7 à 8/14 à 16+1. Rayons branchiostèges 5. Cæcums pyloriques 5 - Vertèbres 10/14.

Corps ovale, comprimé, couvert d'écailles de moyenne grandeur. Hauteur du corps contenue de 2 fois 1/2 à 2 fois 3/4 dans la longueur totale ; longueur de la tête 4 fois à 4 fois 1/2 dans la longueur totale. Museau assez gros, arrondi. Sur chaque mâchoire, 8 incisives assez larges, tranchantes, et implantées obliquement. 3 séries de molaires à la mâchoire supérieure, 2 à la mâchoire inférieure. Diamètre oculaire contenu 4 fois 1/3 dans la longueur de la tête et 1 fois 1/2 dans l'espace préorbitaire, qui est égal à l'espace interorbitaire. Sommet de la tête convexe, formant une protubérance au dessus et en avant de chaque orbite. Préorbitaire ne couvrant pas entièrement le maxillaire. Narines voisines des orbites. 4 à 5 rangées d'écailles sur les joues. La 4^e épine de la Dorsale est la plus longue, mesurant un peu moins que le 1/3 de la hauteur du tronc. 2^e épine de l'Anale plus large et plus longue que la 3^e, et contenue 3 fois 1/3 dans la longueur de la tête (2 fois 3/4 chez les jeunes). Lobe supérieur de la Caudale le plus développé, faisant presque 1/4 de la longueur totale. Pectorales falciformes, s'étendant jusqu'à l'origine de l'Anale, et contenues 3 fois 1/2 dans la longueur totale. Pelviennes faisant 1/6 de la longueur totale.

Coloration argentée ou dorée, avec étroites raies sombres longitudinales, (8 à 9 au dessus, 15 à 16 en dessous de la ligne latérale), et 7 à 8 étroites bandes transversales

noirâtres, dont la 1^{re} va de l'origine de la dorsale à l'aisselle de la Pectorale - Une large bande noire au dessus du tronçon de la queue. Dorsale gris-jaunâtre, Anale brun foncé, Caudale brun jaunâtre, bordée de noir, Pectorales grises ou gris-rosées, avec tache noire à la base, Pelviennes noirâtres ; opercule bordé de noir.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Méditerranée, Atlantique (Golfe de Gascogne, Canaries).

EXPLICATION DE LA PLANCHE

L'animal, réduit environ de moitié, vu de profil. CUVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons VI, pl. 141, 1830.

BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE

OUVRAGES PRINCIPAUX

1758. — LINNÉ, *Sparus sargus*, Syst. nat., Ed. X., p. 278.
1788. — BONNATERRE, *Sparus variegatus*, Tab. Encycl., Ichth., p. 98.
1797. — BLOCH, *Sparus sargus*, Ichth., 8, p. 31, et Tab., 3, pl. 264.
1802. — LACÉPÈDE, *Sparus sargus*, Hist. nat., 4, p. 77, et *Sparus variegatus*, *ibid.*, p. 107-108.
1810. — RISSO, *Sparus sargus*, Ichth. Nice, p. 236.
1827. — GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Isidore), *Sargus raucus*, Descr. Egypte, Hist. nat. Poiss. Mer Rouge et Méditerranée, pl. 18, fig. 1.
1830. — CUVIER et VALENCIENNES, *Sargus rondeletii*, Hist. nat. Poiss. VI, p. 14, pl. 141.
1850. — GUICHENOT, *Sargus rondeletii*, Expl. Algérie Poiss. p. 46.
1859. — GÜNTHER, *Sargus rondeletii*, Cat. Acanth. Fish. Brit. Mus. I. p. 440.
1881. — MOREAU, *Sargus rondeletii*, Hist. nat. Poiss. France, III, p. 5.
1893. — JORDAN et FESLER, *Diplodus sargus*, U. S. Comm. fish. a fisheries, 17, 1889-91, p. 525.
1924. — JOUBIN et LE DANOIS, *Sargus rondeletii*, Mém. Off. Pêches Maritimes, I, p. 99 et fig.

P. CHEVEY