


TELEOSTEI

Acanthopterygii-Perciformes

Sargus vulgaris

(GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 1827)



DIAGNOSE — Dorsale XI à XII-14 à 15, Anale III-14, Caudale 3/17/3, Pectorales 15, Pelviennes 1-5 rayons — Ligne latérale 50 à 55 écailles, ligne transversale 5 à 6/11 à 14 + 1 — Rayons branchiostèges 5 — Cœcums pyloriques 4 — Vertèbres 9 à 10/14.

Corps ovale, comprimé, couvert d'assez grandes écailles munies postérieurement de plusieurs rangées de spinules — Hauteur du corps contenue de 2 fois 1/2 à 2 fois 3/4 dans la longueur totale, longueur de la tête 4 fois dans la longueur totale. Bouche petite, à lèvre supérieure plissée; mâchoires égales munies l'une et l'autre de 8 incisives assez étroites, implantées obliquement, et, sur les côtés, de 2 rangées de molaires arrondies. Diamètre oculaire contenu de 4 fois à 4 fois 1/2 dans la longueur de la tête, de 1 fois 1/2 à 1 fois 2/3 dans la longueur du museau, et 1 fois 1/2 dans l'espace interorbitaire. Sommet de la tête faiblement déprimé, se relevant en bosse au-dessus et en avant des orbites. 4 rangées d'écailles sur les joues. Ligne latérale située au 1/3 supérieur du corps. Le 4^e ou le 5^e rayon épineux de la Dorsale est le plus long; 2^e rayon épineux de l'Anale un peu plus long que le 3^e. Lobe supérieur de la Caudale un peu plus développé que l'inférieur. Pectorales atteignant, ou même dépassant légèrement en arrière, l'origine de la partie molle de l'Anale. Pelviennes plus petites de moitié que les Pectorales, et portant une écaille axillaire externe qui mesure la moitié au moins de la longueur de leur rayon épineux.

Coloration dorée olivâtre, ou, souvent, argentée — 14 à 16 raies longitudinales jaunes d'or, étroites et légèrement flexueuses. Une tache dorée au-dessus de chaque orbite, rejoignant plus ou moins sa symétrique vers la ligne médiane. Une large bande noire allant de la nuque à l'épaule, et une autre en travers du tronçon de la queue, gagnant les rayons mous de la Dorsale, et même ceux de l'Anale chez les jeunes.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Méditerranée.

EXPLICATION DE LA PLANCHE

L'animal, réduit d'un tiers, vu de profil. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Isidore), Descr. Egypte, Hist. nat. Poiss. Mer Rouge et Méditerranée, pl. 18, fig. 2, 1827.

BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE

OUVRAGES PRINCIPAUX

1768. — BRUNNICH, *Sparus sargus* (non Linné), Ichthyologia Massiliensis..., p. 38, n° 52.
1810. — RISSO, *Sargus puntazzo* (part), Ichth. Nice, p. 237.
1827. — GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Isidore), *Sargus vulgaris*, Descr. Egypte, Hist. nat. Poiss. Mer Rouge et Méditerranée, pl. 18, fig. 2, éd. in-8°, XXIV, p. 342.
1830. — CUVIER et VALENCIENNES, *Sargus Salviani*, Hist. nat. Poiss., VI, p. 28.
1846. — BONAPARTE, *Sargus Salviani*, Catal. met. Pesc. europ., n° 469.
1850. — GUICHENOT, *Sargus Salviani*, Expl. Algérie, Poiss., p. 47.
1859. — GÜNTHER, *Sargus vulgaris*, Cat. Acanth. Fish. Brit. Mus., I, p. 437.
1867. — BRITO CAPELLO, *Sargus vulgaris*, Cat. Peix. Portugal, n° 3, p. 20.
1881. — MOREAU, *Sargus vulgaris*, Hist. nat. Poiss. France, III, p. 2, et fig. 146, p. 3.
1893. — JORDAN et FESLER, *Diplodus vulgaris*, U. S. Comm. fish. a. fisheries, 17, 1889-91, p. 525.
1924. — JOUBIN et LE DANOIS, *Sargus sargus*, Mém. Off. Pêches Maritimes, I, p. 97 et fig.

P. CHEVEY