


TELEOSTEI

Acanthopterygii-Scleroparei

Sebastes dactyloptera

(DE LA ROCHE 1809)



Sebastes dactyloptera (DE LA ROCHE 1809)

DIAGNOSE — Dorsale XI, I-12 ou 13, Anale III 5 ou 6, Caudale 16, Pectorales 19, Ventrales I-5 rayons - Ligne latérale 55 à 60 écailles, ligne transversale 9/16+1 - Rayons branchiostèges 7 - Cœcums pyloriques 5 à 7 - Vertèbres 10/14.

Hauteur du corps contenue 3 fois 3/4 dans la longueur totale, longueur de la tête environ 3 fois 1/4 dans la longueur totale. Tête comprimée, garnie d'écailles, armée d'épines ; espace interorbitaire concave, étroit, portant deux sillons, et d'une largeur égale au 1/9 de la longueur de la tête. La mâchoire supérieure dépasse en arrière l'aplomb du diamètre vertical de l'œil ; les deux mâchoires portent des dents fines, en carde, ainsi que le chevron du vomer. La langue est nettement libre antérieurement. Le sourcil porte 3 ou 4 épines, le nasal une épine fort pointue, dirigée en haut et en arrière. Il y a 5 épines préoperculaires, dont la 2^e est la plus saillante. Le corps est couvert d'écailles très rudes ; les 3^e et 4^e rayons de la Dorsale sont les plus longs et la partie molle de cette nageoire à sa base garnie d'écailles ; le 2^e rayon de l'Anale est le plus long. Caudale carrée. Base des Pectorales écailleuse. Coloration rouge avec taches ou bandes brunes ; iris doré ou jaunâtre. Pharynx noir, péritoine noirâtre.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Méditerranée, Madère, Golfe de Gascogne.

EXPLICATION DE LA PLANCHE

L'animal, de grandeur naturelle, vu de profil. HOLT ET CALDERWOOD, Survey of Fishing-grounds, west coast of Ireland, 1890-91 Rep. on the rarer fishes. *Trans. Roy. Dublin Society*, 2 ser. V, p. 409, Pl. XLII, fig. 1.

BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE, OUVRAGES PRINCIPAUX

- 1785-1801. — BLOCH-SCHNEIDER. Blochii Syst. Ichth. p. 194 (d'ap. CUV. VAL., IV, p. 340). (*Scorpæna malabarica* ?).
1809. — DE LA ROCHE. *Ann. Museum*, XIII, p. 51, Pl. 3, fig. 9. (*Scorpæna dactyloptera*).
1820. — RISSO. *Ichth. Nice*, p. 186. (*Scorpæna dactyloptera*).
1827. — RISSO. *Hist. nat. Eur. mérid.*, III, p. 369. (*Scorpæna dactyloptera*).
1829. — CUVIER ET VALENCIENNES. *Hist. nat. Poiss.*, IV p. 336. (*Sebastes imperialis*).
- 1843-60. — LOWE. *Hist. of the fishes of Madeira*, p. 170, tab. xxiv et xxv, fig. 3. (*Sebastes imperialis*).
- 1844-45. — KRÖYER. *Naturhist. Tidssker* I, p. 281. (*Sebastes imperialis*).
1846. — C. BONAPARTE. *Cat. Pesc. Europ.*, n° 537. (*Sebastes imperialis*).
1850. — GUICHENOT. *Explor. Algérie. Poissons*, p. 42. (*Sebastes imperialis*).
1860. — GÜNTHER. *Catal. Acanthopt. fishes Brit. Mus.*, II, p. 99. (*Sebastes dactylopterus*).
1875. — CANESTRINI. *Fa. ital.*, p. 93. (*Sebastes imperialis*).
1881. — MOREAU. *Hist. nat. Poiss. France*, II, p. 317, fi. 117. (*Sebastes dactyloptera*).
1895. — HOLT ET CALDERWOOD. *Trans. Roy. Dublin Society*, 2 ser., V, p. 409, Pl. XLII, fig. 1. (*Scorpæna dactyloptera*).
1924. — JOUBIN ET LE DANOIS. *la Rascasse Chèvre. Mém. Off. Pêches maritimes*, n° 1, p. 149. (*Sebastes dactyloptera*).

P. CHEVEY