


TELEOSTEI

Physoclisti - Carangiformes
Carangidæ

Seriola Dumerili

Risso, 1810.



Seriola Dumerili. JORDAN et EVERMANN. Loc. cit. (Les deux petites épines préanales ne sont pas visibles sur cette figure).

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. — Corps allongé, légèrement comprimé. Tête forte, museau allongé et arrondi à l'extrémité. Bouche moyenne. Prémaxillaires protractives. Maxillaire grand, avec os supplémentaire. Dents villiformes sur les mâchoires, le vomer, les palatins et la langue.

Ligne latérale inerme, légèrement arquée antérieurement. Une faible carene sur le pédoncule caudal chez l'adulte.

Première dorsale épineuse, faible ; deuxième dorsale allongée, plus élevée antérieurement. Pas de pinnules. Anale similaire à la deuxième dorsale mais plus courte. Ventrales longues. Pectorales plus courtes que les ventrales.

CARACTÈRES SPÉCIFIQUES. — Corps allongé, peu comprimé. Abdomen arrondi. Hauteur comprise de 3 fois $1/6$ à 3 fois $5/6$ dans la longueur totale. Ecailles petites : 150 à 180 séries longitudinales.

Coloration. — Gris pourpre avec reflets dorés. Une bande bronzée sur les côtés va du museau à la caudale. Ventre blanc. Nageoires jaune-brunâtre.

Les jeunes présentent des bandes noirâtres sur les flancs.

Tête grande, comprise 3 fois $1/4$ à 3 fois $1/2$ dans la longueur totale. Museau long arrondi à l'extrémité, compris environ 2 fois $1/2$ dans la longueur de la tête. Yeux de 4 fois $1/2$ à 5 fois $1/2$ dans la longueur de la tête.

Bouche grande, terminale, légèrement oblique, maxillaire atteignant la ligne verticale passant par le milieu de l'œil.

Dents petites, villiformes, en bandes sur les mâchoires, le vomer, les palatins et la langue. Préopercule non dentelé.

Branchiospines développées. Leur longueur est sensiblement égale au diamètre de l'œil. 10 à 12 sur la branche inférieure du premier arc branchial.

Nageoires. — Première dorsale ayant de 6 à 8 faibles rayons épineux réunis par une membrane. Deuxième dorsale, longue, élevée antérieurement. Caudale nettement fourchue. Ventrales bien développées, plus longues que les pectorales et insérées au-dessus de celles-ci.

Anale similaire à la deuxième dorsale mais bien plus courte. Précédée de deux très petites épines libres.

Ligne latérale inerme, arquée antérieurement, se prolongeant en carène sur le pédoncule caudal.

Vessie natatoire simple.

Rayons branchiostèges : VII.

Dorsale : VI à VIII + 34 à 39. Anale : II + 18 à 20.

Pectorales : 20. Ventrales : I + 5. Vertèbres : 10 + 14.

Cœcums pyloriques. Très nombreux.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE, BIOLOGIE. — Méditerranée. Espagne. Portugal. Côte Occidentale d'Afrique. Côte d'Amérique: du Brésil au Massachussets.

SYNONYMIE, BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, OUVRAGES PRINCIPAUX

1810. — RISSO. Ichthyol. Nice, 175. Pl. 6, fig. 20. (*Caranx Dumerili*).
1810. — RAFINESQUE, CARATTERI. P. 42, pl. 11, fig. 2. (*Trachurus aliciclus*.)
1815. — MITCHILL. Trans. Lit. et Phil. Soc. N. Y., p. 427. (*Scomber zonatus*.)
1810. — RAFINESQUE. Indice. N° 108, 21 et 53. (*Trachurus fasciatus*.)
1827. — RISSO. Pois. Eur. Mérid. III. 424. (*Seriola Dumérili*.)
1829. — CUVIER. Règne Animal. E. II. 130, pl. 56, fig. 1. (*Seriola Dumérili*.)
1833. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Pois. IX, p. 201, pl. 258. (*Seriola Dumérili*.)
1860. — GUNTHER. Catalogue II, p. 460. (*Seriola Dumérili*.)
1861. — POEY. Memorias II. 229. (*Seriola proxima*.)
1868. — STEINDACHNER. Ichth. Beritche. V. 40. (*Seriola Dumérili*.)
1874. — STEINDACHNER. Ichth. Beitrage. 1. 20. (*Seriola Dumérili*.)
- 1896-1900. — JORDAN et EVERMANN. Fishes North Middle America, p. 902, pl. 139, fig. 381. (*Seriola zonata*.)

Jean LE GALL, 1933.