


TELEOSTEI*Acanthopterygii-Perciformes***Serranus cabrilla**

(LINNÉ 1766)



DIAGNOSE -- Dorsale X-13 à 15, Anale III-7 ou 8, Caudale 17, Pectorales 14, Ventrals I-5 rayons - Ligne latérale 80 à 100 écailles, ligne transversale 5 à 7/22 à 28+1 - Rayons branchiostèges 7 - Cæcums pyloriques 3 - Vertèbres 10/14.

Hauteur du Corps contenue de 3 fois 1/4 à 3 fois 3/4 dans la longueur totale, longueur de la tête 2 fois 3/4 à 3 fois dans la longueur totale. Œil compris de 4 à 6 fois dans la longueur de la tête, plus petit que la distance préorbitaire. Espace interorbitaire de 5 à 6 fois dans la longueur de la tête. Mâchoire inférieure plus longue que la supérieure, et armée de fortes canines sur les côtés. Le maxillaire atteint ou dépasse (chez les individus âgés) l'aplomb du diamètre vertical de l'œil. Écailles absentes sur le museau et le dessus de la tête, présentes sur l'opercule et le préopercule; ce dernier finement crénelé, surtout sur son bord vertical. Épines operculaires fortes. De 13 à 16 branchiospines sur la branche inférieure du 1^{er} arc branchial. Partie épineuse et partie molle de la Dorsale entièrement unies. Espaces interradiaires de la Dorsale et de l'Anale portant de petites bandes d'écailles. Pectorales plus longues que les Ventrals. Ligne latérale formant un angle au niveau du dernier rayon de la Dorsale. Coloration du corps: ♂, gris jaunâtre ou rouge clair avec 7 à 9 bandes verticales rouges brunâtre et 3 ou 4 bandes longitudinales jaunâtres ou rouge vermillon; dessous de la gorge rose vif; 3 bandes obliques jaunes ou lilas sur les joues, dirigées de bas en haut et d'arrière en avant. ♀, roses saumon, à bandes verticales moins vives et bandes longitudinales jaunes pâles; bandes oblique des joues peu nettes ou absentes. Coloration des nageoires dorsale, anale et caudale. Bandes ou rangées de points azurées ou lilas.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Méditerranée, Atlantique (de la Manche aux Canaries), Mer Rouge.

EXPLICATION DE LA PLANCHE

L'animal, réduit d'un tiers, vu de profil. JOUBIN et LE DANOIS, Mém. Off. Pêches maritimes, n° 1, fig. p. 85, 1924.

**BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE,
OUVRAGES PRINCIPAUX.**

1766. — LINNÉ. *Perca cabrilla*, Systema Naturæ, I, p. 488.
1790. — BLOCH. *Holocentrus argentinus*, Naturgeschichte der ausländischen Fische, IV, p. 173, pl. CCXXXV, fig. 2.
1802. — LACÉPÈDE. *Lutjanus serran*, Poissons, IV, p. 205.
Bodianus hialula, ibidem, p. 297.
1810. — RISSO. *Holocentrus flavus*, Ichth. Nice, p. 293.
Holocentrus serran, ibidem, p. 294.
1826. — RISSO. *Serranus cabrilla*, Eur. Mérid., III, p. 375.
Serranus flavus, ibidem, p. 376.
1828. — CUVIER ET VALENCIENNES. *Serranus cabrilla*, Hist. Nat. Poissons, II, p. 223, pl. XXIX.
1832. — COUCH. *Perca channus*, Mag. Nat. Hist., V, p. 19 et fig.
1836. — YARREL. *Serranus cabrilla*, Brit. Fish., I, p. 19 et fig.
1854. — GRONOW. *Perca mormyrus*, Catal., p. 109
1859. — GÜNTHER. *Centropristis praestigiator*, spec. a-b (non Poey), Catal. Acanthopt. Fish. Brit. Mus., I, p. 85.
1859. — GÜNTHER. *Serranus cabrilla*, part., ibidem, p. 106.
1862. — COUCH. *Serranus cabrilla*, Brit. Fish., I, p. 195, pl. XLII.
1877. — KOSSMANN ET RAÜBER. *Pseudoserranus bicolor*, Ergebn. Reise Roth. Meer, p. 7, pl. I, fig. 1.
1880. — DAY. *Serranus cabrilla*, Fish. Gr. Brit., p. 14, pl. IV.
1884. — KLUNZINGER. *Pseudoserranus cabrilla*, Fische Roth. Meer, p. 7, pl. II, fig. 4-5.
1890. — JORDAN ET EIGENMANN. *Serranus cabrilla*, Bull. U. S. Fish. Comm., VIII, p. 411.
1895. — BOULENGER. *Serranus cabrilla*, Catal. Fish. Brit. Mus., 2^e éd., I, p. 283.
1924. — JOUBIN ET LE DANOIS. *Serranus cabrilla*, Mém. Off. Pêches Maritimes I, p. 85 et fig.

CHEVEY