



DIAGNOSE — Coquille subcylindrique, droite, très allongée transversalement, équivalve, bâillante aux deux extrémités, très inéquilatérale; bord antérieur obliquement tronqué et précédé d'un étranglement produit par un sillon profond en forme de gouttière; bord postérieur tronqué à angle droit; sommets antérieurs, terminaux.

Test médiocrement solide, pourvu de stries d'accroissement et divisé en deux aires triangulaires par une ligne diagonale peu marquée partant du sommet. Epiderme épais, brillant, verdâtre, peu persistant, se prolongeant au-delà des bords de la coquille.

Coloration externe blanche, plus ou moins teintée de fauve.

Ligament marginal, brun, saillant à l'extérieur.

Charnière composée, dans chaque valve, d'une dent cardinale unique très saillante.

Intérieur des valves lisse et luisant; ligne palléale sinueuse en avant et arrière.

Diamètre umbono-ventral : 12 à 25 m/m; diamètre antéro-postérieur : 80 à 150 m/m; épaisseur : 10 à 15 m/m.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Atlantique et Méditerranée : Zone littorale où ce mollusque est enfoncé, dans le sable, à une assez grande profondeur.

Le *S. vagina* L. = *marginatus* Donovan atteint une taille plus forte dans la Méditerranée que dans l'Océan.

Nom vulgaire : Couteau droit.

BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE

OUVRAGES PRINCIPAUX

1758. — LINNÉ, Systema Naturæ, ed. X, p. 672 (*Solen vagina* [pars]).
 1803. — DONOVAN, Natural History of British Shells, IV, pl. 110 (*S. marginatus*).
 1870. — HIDALGO, Moluscos marinos de España, p. 180 (*S. marginatus* Pulteney), pl. 28, fig. 1 (*S. vagina* L.).
 1874. — SOWERBY, in REEVE, Conchologia Iconica, XIX, *Solen*, pl. II, fig. 4 (*S. marginatus* Pult.).
 1895. — BUCQUOY, DAUTZENBERG, DOLLFUS, Mollusques marins du Roussillon, II, p. 495, pl. LXXII, fig. 1 - 3 (*S. marginatus* Pennant).
 1897. — DAUTZENBERG, Atlas de poche des Coquilles des côtes de France, pl. 54, fig. 180 (*S. marginatus* Penn.).

ED. LAMY — 1929.