


SELACHII

Squatiniformes Squatinidae

Squatina squatina

(LINNÆUS 1758)



DIAGNOSIS — Cuerpo largo y plano; pectorales muy amplias, carnosas y subtriangulares, perfectamente separadas de la cabeza y de las ventrales; dorsales muy retrasadas, sobre un largo pedunculo caudal que termina en corta aleta bilobada.

Denticulos dérmicos, aparentes, de mayor tamaño a lo largo de la línea media dorsal hasta comenzar el pedunculo caudal. Son ganchudos y lisos.

Cabeza discoidal, notablemente mas ancha que larga, con margen anterior, visto dorsalmente, interrumpido por expansiones digitiformes nasales. Ojos pequeños, con diámetro menor que la anchura del espiráculo. Cartilago labial bien desarrollado. Dientes semejantes en ambas mandibulas, puntiagudos con base ancha, espaciados y dispuestos en series simétricas. Hendiduras branquiales laterales, en parte cortadas por el borde interno de las amplias pectorales.

Color pardo verdoso, dorsalmente con manchas negruzcas esparecidas de varia intensidad. Ventralmente blanquecino.

Tamaños : llega de 1 y 1/2 a 2 metros de longitud.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA — Mediterráneo, Atlántico, Pacífico.

EXPLICACION DE LA LAMINA

Ejemplar adulto, segun F. Day.

BIBLIOGRAFIA, ICONOGRAFIA, SINONIMIA

OBRAS PRINCIPALES

1554. — RONDELET. (*Squatina angelus*), De Pisc. mar. p. 367.
1758. — LINNAEUS. (*Squalus squatina*), Syst. Nat. Ed. X, p. 233.
1810. — RAFINESQUE. (*Rhina squatina*), Caratt. anim. e piante della Sicilia. p. 14.
1810. — RISSO. (*Squatina vulgaris*) Ichthy. Nice, p. 45.
1816. — BLAINVILLE. (*Squatina angelus*), Prodr. nouvelle dist. syst. du règne animal. *Bull. Soc. Philomatique*. VIII, p. 121.
1841. — BONAPARTE. (*Squatina angelus*), Icon. faun. italica. III, fig.
1912. — ROULE. (*Squatina angelus*), Sélac. conservés coll. Musée Océan. *Bull. Inst. Océan.* 243. p. 18.
1913. — GARMAN. (*Rhina squatina*), The Plagiostoma, *Mem. Mus. Comp. Zool.* XXXVI. p. 251.

F. DE BUEN