


TELEOSTEI

*Physoclisti*

*Scombriformes - Stromateidæ*

# *Stromateus fiatola*

LINNÉ 1735



*Stromateus fiatola*. CUVIER et VALENCIENNES. Histoire Naturelle Poissons. P. 272.

**CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.** — (Genre *Stromateus*, ARTEDI).

Corps comprimé, plus ou moins élevé, couvert de petites écailles. Bouche modérée ou petite. Une seule dorsale, une seule anale avec deux ou trois petites épines antérieures. Pas de ventrales chez l'adulte.

Dents petites, sur une seule rangée, insérées sur le bord de la mâchoire. Palatins et langue lisses. Œsophage armé de dents osseuses.

5 à 7 rayons branchiostèges. Une pseudobranchie. Pas de vessie natatoire. Cœcums pyloriques très nombreux (GUNTHER).

**CARACTÈRES SPÉCIFIQUES.** — Corps fusiforme aplati : sa hauteur étant comprise 3 fois environ dans la longueur totale ; l'épaisseur 4 fois dans la hauteur.

La ligne dorsale descend lentement et s'arrondit au bout du museau qui est tronqué. Écailles très petites, rondes.

**Coloration.** — Bleu d'acier dorsalement, plombée sur les flancs, blanc argenté ventralement. Plusieurs rangées oblongues de taches brunes dorées ou ardoisées. Iris doré.

**Tête.** — Sa longueur est comprise environ 5 fois dans la longueur totale. L'œil est au-dessous de la ligne médiane et un peu en avant du milieu de la longueur de la tête ; son diamètre est égal au 1/5 de cette longueur. Mâchoire inférieure légèrement proéminente. Dents très petites sur une seule rangée, absentes sur le palais et la langue. Préopercule à bord semi-circulaire lisse. Opercule légèrement strié à la base avec au bord un petit angle saillant obtus.

**Nageoires.** — *Dorsale*, unique, commence vis-à-vis du milieu de la pectorale. Son bord, qui continue la ligne de la nuque, s'élève ensuite jusque vers le milieu du tronc et diminue après. *Anale* : débute sous le milieu du tronc ; est d'abord élevée et s'abaisse ensuite comme la dorsale. Pédoncule caudal, dégagé. *Caudale* robuste, nettement fourchue. *Pectorales* ovales, atteignent 1/6 de la longueur totale.

Un très léger bourrelet représente les ventrales.  
*Ligne latérale* : parallèle à la ligne dorsale.  
Rayons branchiostèges : VI.  
Dorsale : V + 40. Anale : III + 33. Caudale : 17.  
Pectorales : 23.  
Cœcums pyloriques extrêmement nombreux.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE, BIOLOGIE.** — Méditerranée, Côtes Sud d'Espagne. Côte Nord-Ouest Afrique.

**SYNONYMIE, BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, OUVRAGES PRINCIPAUX**

1735. — LINNÉ. Syst. I, p. 432. (*Stromateus fiatola*.)  
1801. — BLOCH-SCHNEIDER. Syst. Ichthyol., p. 492. (*Stromateus fiatola*.)  
1803. — LACÉPÈDE. Hist. Pois. II, p. 316. (*Stromateus fiatola*.)  
1833. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Pois. IX, p. 373, pl. 272. (*Stromateus fiatola*.)  
1810. — RISSO. Ichthol. Nice, p. 100. (*Stromateus fiatola*.)  
1830. — CUVIER. Règne Animal Poiss., pl. 63, fig. 1. (*Stromateus fiatola*.)  
1832-1841. — BONAPARTE. Faun. Ital. Pesci. (*Stromateus fiatola*.)  
1850. — GUICHENOT. Exploration Algérie Poiss., p. 64. (*Stromateus fiatola*.)  
1860. — GUNTHER. Catalogue II, p. 397. (*Stromateus fiatola*.)  
1803. — LACÉPÈDE. IV, pp. 697-698. (*Chrysostromus fiatoloïdes*.)

Jean LE GALL, 1933.