



EXPLICATION DE LA PLANCHE

Fig. 1. Face dorsale.

Fig. 2. Face ventrale.

DIAGNOSE — Cinq bras. Les plaques dorsales sont disposées en rangées longitudinales : une carinale et une dorso-latérale dans lesquelles chaque plaque est munie d'un fort piquant entouré à la base d'une collerette à pédicellaires croisés, et enfin des plaques marginales dorsales et ventrales. Celles-ci sont grandes et les deux séries sont séparées par un large sillon ; les plaques marginales dorsales portent un piquant et les marginales ventrales deux. Les papules de la face dorsale sont ordinairement réunies par groupes de trois, tandis qu'elles sont isolées sur la face ventrale. Les piquants ambulacraires sont très régulièrement bisériés.

Le diamètre total peut atteindre 90 mm. Les piquants de la face dorsale forment cinq rangées longitudinales très régulières; il y a en outre sur la face ventrale une rangée latéro-ventrale. Il n'existe de pédicellaires droits ni dans le sillon ni sur aucune partie du corps. La couleur est brunâtre ou rouge-brunâtre, tantôt plus claire tantôt plus foncée.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE — L'espèce paraît très rare; jusqu'à présent, elle a été trouvée en Méditerranée vers Cérigo (160 mètres) et vers l'île de Pelagosa dans l'Adriatique (485 mètres). Perrier l'a décrite d'après un exemplaire de très petite taille trouvé au large des Sables-d'Olonne, à 166 mètres.

**BIBLIOGRAPHIE. ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE
OUVRAGES PRINCIPAUX**

1895. — E. VON MARENZELLER. Zoologische Ergebnisse, V. Echinodermen, p. 14, pl. 1, fig. 2. (*Asterias neglecta*).
1897. — H. LUDWIG. Die Seesterne des Mittelmeeres, p. 395 (*Asterias Edmundi*).
1927. — R. KÖHLER. Les Échinodermes des Mers d'Europe, p. 106, pl. 2, fig. 10.

R. KÖHLER 1930.