



DIAGNOSE — Corps allongé, dont l'épaisseur décroît graduellement vers la queue, couvert d'anneaux osseux cutanés. Partie antérieure du corps parcourue presque jusqu'à la marge postérieure de la dorsale par six crêtes longitudinales, pas très accentuées, formées par les arêtes des anneaux osseux : deux crêtes latérales-supérieures qui se terminent environ au niveau de la fin de la nageoire dorsale ; deux latérales-moyennes, qui, en se portant dorsalement et en présentant quelquefois une petite interruption, deviennent supérieures dans la région caudale ; deux latérales-inférieures qui se continuent jusqu'à la queue. Dans la région caudale le corps présente une section quadrangulaire. Numéro des anneaux osseux : 52-58, dont 18-20 préanales. Longueur atteint 30 cm.

Tête plus longue que la dorsale, comprise (dans les adultes) $5\frac{3}{4}$ -6 fois dans la longueur totale. Museau allongé, comprimé ; crête moyenne dorsale haute, de manière que le profil dorsal du museau est presque droit. Fente buccale petite, oblique. Organe olfactif en avant des yeux. Yeux pas très grands, ronds. Crête sourciliaire relevée. Opercules grands striés ; trois rayons branchiostèges.

Pectorales petites rondes, avec 14-17 rayons. Dorsale embrassant 7-11 anneaux (du 19^e-20^e aux 27^e-28^e) avec 31-40 rayons. Anale petite avec 3 rayons. Caudale arrondie avec 10 rayons. Anus au niveau de la marge antérieure de la dorsale, plus en avant de la moitié du corps. Poche incubatrice du mâle en arrière de l'anus, allongée sur 20-23 anneaux.

Teinte brune ou verdâtre avec taches blanches plus ou moins distinctes.

Les jeunes sortent de la poche incubatrice du mâle ayant tous les caractères de l'adulte.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Méditerranée, côtes Atlantiques européennes jusqu'à la Manche.

EXPLICATION DE LA FIGURE

Mâle adulte avec embryons dans la poche incubatrice. Rauther, Pl. I, fig. 10.

BIBLIOGRAPHIE

1856. — KAUP. Catalogue of Lophobranchiate Fish. p. 49.
1870. — DUMÉRIEUX. Hist. nat. des Poissons. II. p. 576.
1870. — GÜNTHER. Catalogue of Fishes. VIII. p. 154.
1872. — CANESTRINI. Fauna d'Italia. Pesci. p. 141.
1878. — COUCH. Hist. Fishes British Islands. IV. p. 355, Pl. CCXXXIX. fig. 2.
1880. — HEINCKE. Arch. Naturgesch. XLVI. p. 321.
1881. — MOREAU. Poissons de la France. II. p. 55. fig. 87.
1881-84. — DAY. Fishes of Great Britain. II. p. 257. Pl. CXLIV. fig. 3.
1908. — DUNCKER. Mitt. Naturh. Mus. Hamburg. XXV.
1925. — RAUTHER. Die Syngnathiden. Fauna und Flora des Golfes von Neapel. Monogr. 36. p. 4, Pl. I. fig. 10.

SYNONYMIE

Syngnathus Rondeletii Delaroche, *S. viridis*, *pelagicus*, *pyrois* Risso, *S. argentatus* Pall. *S. rhynchaeus*, *rotundatus* Michah., *Siphonostomus typhle* Kaup, *S. argentatus* Kaup, *S. rotundatus* Kaup. *Siphostoma typhle* Bp., *Siphonostoma typhle* Dum., ? *Typhle heptagonus* Raf.

D'ANCONA 1929.