



**DIAGNOSE** — Coquille de forme subtriangulaire arrondie, un peu transverse, renflée ; sommets incurvés en avant ; lunule lancéolée bien délimitée.

Surface terne pourvue de nombreux sillons concentriques et de stries rayonnantes irrégulières. Epiderme très mince.

Coloration externe d'un blanc jaunâtre, plus ou moins maculé de brun sur la région postérieure et orné de fascies plus foncées, ainsi que de linéoles qui s'entrecroisent en un réseau brun ou rougeâtre.

Ligament externe brunâtre.

Charnière : dans la valve gauche, trois dents cardinales presque d'égale longueur, l'antérieure pointue, la médiane plus forte et bifide, la postérieure très étroite ; dans la valve droite, trois dents cardinales aiguës et saillantes.

Intérieur des valves luisant, d'un jaune doré ; impression palléale pourvue d'un grand sinus arrondi au sommet.

Diamètre umbono-ventral : 15 à 25  $\frac{m}{m}$  ; diamètre antéro-postérieur : 25 à 35  $\frac{m}{m}$  ; épaisseur : 10 à 20  $\frac{m}{m}$ .

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE** — Zone littorale. Le *T. aureus* typique vit surtout dans la Manche et l'Océan Atlantique, tandis que dans la Méditerranée on trouve deux variétés spéciales : var. *catenifera* Lk., forme bien ovale, moins convexe, plus transverse, coloration blanche avec rayons bruns interrompus, et var. *texturata* Lk., coquille mince à contour ovale, entièrement couverte d'un réseau de linéoles brunes ; le type et ces deux variétés présentent une mutation *bicolor*, blanche avec un large rayon brun sur la région postérieure.

Noms vulgaires : Clovisse jaune, Palourde jaune.

**BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE,  
OUVRAGES PRINCIPAUX**

1784. — CHEMNITZ, Conchylien Cabinet, VII, p. 48, pl. 42, fig. 443 (*Venus textrix* [pars = *Venus texturata* Lk.]).
1790. — GMELIN, Systema Naturæ, ed. XIII, p. 3288 (*Venus aurea*).
1818. — LAMARCK, Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres, V, p. 607 (*Venus texturata*) et 613 (*Venus catenifera*).
1864. — REEVE, Conchologia Iconica, XIV, *Tapes*, pl. VIII, fig. 37 a-b (*Tapes aurea* Gmel.), pl. XIII, fig. 70 (*T. texturata* Lk.).
1870. — HIDALGO, Moluscos marinos de España, p. 157, pl. 45 A, fig. 1-6 et pl. 46, fig. 1-7 (*Tapes aureus* Gmel.), pl. 46, fig. 8-9, pl. 46 A, fig. 1-7, pl. 47, fig. 1-7 et pl. 47 A, fig. 10 (*T. texturatus* Lk.).
1893. — BUCQUOY, DAUTZENBERG, DOLLFUS, Mollusques marins du Roussillon, II, p. 414, pl. LXIII, fig. 1-10 (*Tapes aureus* Gmel.), fig. 11-15 (var. *catenifera* Lk. [fig. 14, mut. *bicolor*]), pl. LXIV, fig. 1-8 (var. *texturata* Lk.).
1897. — DAUTZENBERG, Atlas de poche des Coquilles des côtes de France, pl. 51, fig. 168 (*Tapes aureus* Gmel.) et 169 (*T. texturatus* Lk.).

ED. LAMY 1929.