



DIAGNOSE — Coquille subrhomboïdale transverse arrondie en avant, tronquée en arrière, solide, équivalve, inéquilatérale; sommets renflés, incurvés en avant; lunule lancéolée peu apparente. Surface terne couverte de très nombreuses costules rayonnantes, inégales, plus fortes aux deux extrémités de la coquille, et de stries concentriques fines sur la partie médiane des valves, mais beaucoup plus marquées sur les régions antérieure et postérieure, où elles déterminent une sculpture nettement treillissée. Epiderme peu persistant. Coloration externe très variable, passant du gris au roux plus ou moins foncé, parsemée de ponctuations, de taches ou de flammules brunes ou noirâtres qui sont parfois disposées en trois rayons divergents. Ligament saillant d'un brun foncé. Charnière: dans la valve gauche, trois dents cardinales, l'antérieure pointue et très saillante, la médiane plus forte et bifide, la postérieure plus faible, très étroite et presque parallèle à la nymphe ligamentaire; dans la valve droite, trois dents cardinales très aiguës et saillantes. Intérieur des valves mat, d'un blanc jaunâtre ou bleuâtre; impressions musculaires très luisantes; impression palléale pourvue d'un grand sinus largement ouvert, arrondi au sommet. Diamètre umbono-ventral: 25 à 45 mm.; diamètre antéro-postérieur: 35 à 60 mm.; épaisseur: 15 à 25 mm.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Ce mollusque se trouve sur les plages de la zone littorale, à quelques centimètres de profondeur dans le sable vaseux.

Dans la Méditerranée vit surtout le *T. decussatus* typique, plus transverse, plus ovale et plus finement sculpté, tandis que sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique prédomine une variété *fusca* Gmelin, ordinairement d'un brun orangé uniforme, moins transverse, plus rhomboïdale, plus nettement treillissée. Noms vulgaires: Clovisse, Palourde.

**BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE,
OUVRAGES PRINCIPAUX**

1758. — LINNÉ, Systema Naturæ, ed. X, p. 690 (*Venus decussata*).
1784. — CHEMNITZ, Conchylien-Cabinet, VII, p. 58, pl. 43, fig. 455-456 (*Venus decussata* L.).
1790. — GMELIN, Systema Naturæ, ed. XIII, p. 3281 (*Venus fusca*).
1864. — REEVE, Conchologia Iconica, XIV, *Tapes*, pl. XI, fig. 57 *a-b* (*Tapes decussata* L.).
1870. — HIDALGO, Moluscos marinos de España, p. 156, pl. 42, fig. 1-7 (*Tapes decussatus* L.).
1893. — BUCQUOY, DAUTZENBERG, DOLLFUS. Mollusques marins du Roussillon, II, p. 430,
pl. LXV, fig. 1-8 (*Tapes decussatus* L.), pl. LXVI, fig. 4-5 (var. *fusca* Gmel.).
1897. — DAUTZENBERG Atlas de poche des Coquilles des côtes de France, pl. 50, fig. 165
(*Tapes decussatus* L.) et 166 (var. *fusca* Gmel.).

ED. LAMY—1928