



TELEOSTEI  
*Apodes - Todaridæ*

# Todarus brevirostris

(FACCIOLA 1887)



3



2

## EXPLICATION

### DE LA PLANCHE

*Fig. 1.* Individu adulte. Grassi, pl. X, fig. 11.

*Fig. 2.* Tête du même. Grassi, pl. X, fig. 1.

*n. a.* narine antérieure.  
*n. p.* narine postérieure.

*Fig. 3.* Larve. Grassi, pl. X, fig. 1.



1

**Todarus brevirostris** (FACCIOLA 1887)

**DIAGNOSE** — Corps cylindrique, comprimé; queue aplatie, légèrement arrondie à l'extrémité. Longueur environ 20 cm.

Tête petite, comprimée, contenue plus que 20 fois dans la longueur totale. Museau obtus avec des papilles caractéristiques.

Mâchoire supérieure proéminente. Fente buccale étendue au delà de l'œil. Sur les maxillaires une série de petites dents, sur les dentals antérieurement 3 robustes dents de chaque côté, postérieurement une série de dents très petites, quelquefois doublées du côté lingual. 6-7 robustes dents vomériennes. Narines antérieures tubulaires, environ au niveau du bord antérieur de la mâchoire inférieure; postérieures, avec le bord relevé antérieurement, près du bord antéro-inférieur de l'œil. Œil arrondi, petit, contenu environ 10 fois dans la longueur de la tête. Espace préorbitaire égale environ 4 fois le diamètre de l'œil. Fente branchiale petite, ovale.

Nageoires pectorales absentes. Dorsale haute commençant quelque peu en arrière de la fente branchiale. Anale aussi haute. Couleur généralement marron-clair, finement ponctuée, ça et là avec des points et petites lignes obscures; une série très distincte de points obscurs le long de la ligne latérale. Couleur plus claire sur le ventre. Nageoires blanches, excepté la partie postérieure de l'anale qui est rayée de marron.

190-200 vertèbres, dont quelques unes plus de 30 préanales.

Larve leptocéphalienne caractérisée par l'œil télescopique (*Leptocephalus telescopicus* Schmidt). Tête basse allongée. Corps haut, queue amincie, ouverture anale située en avant de la moitié du corps. Nageoires développées. Le long de l'intestin ponctuation plutôt grossière, peu régulière. Autres points abdominaux latéraux en arrière de l'anale. Ponctuation serrée à la base de l'anale et moins régulière sur la caudale. 4-5 fines taches sur la tête en arrière des yeux. Le dernier hypural avec 6 rayons, l'avant dernier longuement fendu avec 3.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE** — Méditerranée : Messina, rare.

#### **BIBLIOGRAPHIE, SYNONYMES**

1887. — FACCIOLA. *Natularista siciliano*, VI. (*Nellastoma brevirostris*).  
1905. — SUPINO. *Ricerche Lab. Anat. Roma*. XI.  
1913. — GRASSI. *Metamorfosi dei Murenoidi*.  
1913. — SCHMIDT. *Medd. Komm. Havunders. København. Fiskeri*. IV.  
1917. — GRASSI. *R. Comit. Talass. It.* XLV.

D'ANCONA