

**EXPLICATION DE LA PLANCHE**

Exemplaire vu par la face dorsale et la face ventrale. D'après BONAPARTE.

**DIAGNOSE** — Corps aplati ; la tête et la partie antérieure du corps avec les nageoires pectorales constituent une portion discoïdale plus large que longue ; antérieurement à la limite des nageoires pectorales le disque présente deux échancrures, postérieurement sa marge est crénelée. Partie postérieure conique courte ; distance du commencement de la première dorsale au bout caudale faisant environ  $\frac{2}{5}$  de la longueur totale.

Yeux petits, allongés, dont les plus grands diamètres divergent obliquement en arrière ; diamètre contenu environ 4-5 fois dans l'espace préorbital, environ 3 dans l'espace interorbital. Spiracles réniformes, immédiatement en arrière des yeux ; leur diamètre est plus grand que celui de l'œil ; pas de franges ou tentacules sur la marge du spiracle.

Bouche petite sur la face inférieure du disque ; sa largeur plus petite que l'espace préoral. Mâchoires pourvues de petites dents triangulaires pointues, disposées en 5-6 ordres. Narines à l'avant des angles de la bouche, confluentes avec celle-ci ; 5 paires de fentes branchiales, situées vers le milieu de la face ventrale du disque. Anus quelque peu en avant du  $\frac{2}{3}$  de la longueur totale.

Première dorsale deux fois plus développée que la seconde, plus haute que longue, commençant au dessus de la marge postérieure des ventrales. Deuxième aussi plus haute que longue sur le pédoncule caudal. Ventrales grandes, rondes, commençant à la fin des pectorales, crénelées postérieurement. Caudale environ aussi longue que large, lobe dorsal un peu plus grand que le ventral. Pédoncule caudal avec des replis latéraux.

Peau nue, lisse. Couleur du dos variable, uniforme, brune, rouge-noirâtre ; face ventrale blanche-rosée, aux marges des nageoires généralement brune. Yeux entourés par un bord blanchâtre.

Longueur totale jusqu'à 1 mètre 50.

Vivipare.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE** — Méditerranée, Atlantique oriental de Madera jusqu'aux côtes de la Grande-Bretagne. Rare.

#### BIBLIOGRAPHIE

- 1832-41. — BONAPARTE, Iconogr. Fauna Ital., Pesci.  
1840. — THOMPSON, Ann. Mag. Nat. Hist., V, p. 292.  
1850. — GUICHENOT, Explor. Scient. Algér., Poissons, p. 131, Pl. VIII.  
1859. — YARRELL, Hist. Brit. Fish., 3 ed., II, p. 544.  
1865. — DUMÉRIL, Hist. Nat. Poissons, I, p. 512.  
1870. — GÜNTHER, Cat. Fishes Brit. Mus., VIII, p. 449.  
1872. — CANESTRINI, Fauna Italia Pesci, p. 53.  
1880-84. — DAY, Fishes Great Britain, II, p. 331, Pl. CLXIV.  
1881. — MOREAU, Poissons France, J, p. 386.  
1928. — LOZANO, Peces Fauna Iberica, I, p. 523, fig. 168.

#### SYNONYMIE

*Torpedo Walshii* Thompson, *T. nigra* Guich, *T. hebetans* Lowe, *T. emarginata* Mc Coy, *T. occidentalis* Storer.

U. D'ANCONA — 1931.