


TELEOSTEI

*Trichiuridæ*

# Trichiurus lepturus

(LIN. 1758)



**DIAGNOSI** — Corpo molto compresso ed allungato, la sua altezza sta 16-17 volte nella lunghezza totale del pesce. La lunghezza della testa forma un ottavo della lunghezza del pesce.

Occhio grande, circa il sesto quello della testa.

Coda molto lunga e sottile che termina in un prolungamento filiforme. Lo squarcio della bocca va oltre il margine dell'occhio. Mascelle appuntite, l'inferiore oltrepassa la superiore. Esse sono provviste di denti aculeiformi; quattro di grandi, ricurvi sulla superiore e due sulla inferiore.

La dorsale che incomincia subito dietro l'occipite conta 135 raggi.

L'anale con 115 raggi isolati; essi sono quasi invisibili data la piccolezza delle spine delle quali alcune sono nascoste dalla pelle. Pettorali con 12 raggi.

La linea laterale è arquata anteriormente, nel rimanente segue la linea del dorso. Mancano le ventrali e la codale.

La colorazione è bianca argentea, la pinna dorsale è più scura e, negli esemplari da me osservati, fra il 3° ed il 5° raggio della dorsale, constatai una leggera macchia scura.

**DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA** — Rio de Janeiro — Montevideo — Nuova York — Portorico — Cuba — Jamaica — Senegal — Porto Said — Isole Ionie — Trieste — Spalato.

## BIBLIOGRAFIA

1758. — LINNÉ. Syst. nat. Edit. X, p. 429, (*Trichurus lepturus*).

1785-1801. — BLOCH SCHNEIDER. Blochii Syst. ichth, fig. 158.

1847. — BONAPARTE. Cat. Pesc. Europ. n° 709.

1830-1833 — LACÉPÈDE. Hist. nat. des Poissons. VII, pag. 46.

1837-1843. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. nat. des Poissons. VIII, pag. 237.

18 . — YARREL. Hist. nat. des Poissons. II, pag. 275.

1912. — NINNI. Cat. Pes. Adriat. pag. 66.

DE BUEN F. Cat. ict. Esp. y. Maruecos. pag 144.

E. NINNI—1929.

**Trichiurus lepturus** (LIN. 1758)