



EXPLICATION DES FIGURES

- Fig. 1. L'animal vu de profil. DAY. Fish. great Britain p. 59. Pl. XXIV.
Fig. 2. Face supérieure de la tête. LE DANOIS. l. c. P. 73, fig. 114.
Fig. 3. Profil antérieur du museau. LE DANOIS. l. c. P. 74, fig. 119.
Fig. 4. Ligne latérale avec écailles lisses. LE DANOIS. P. 72, fig. 109.
Fig. 5. Œuf flottant avec globule huileux. CANU. Ann. Stat. Aquicole
Boulogne. Vol. II. Pl. VI.
Fig. 6. Larve après résorption du jaune. CANU. l. c.
Fig. 7. Larve 20 m/m long. SMITT. l. c. p. 201, fig. 58.

Triglae Laeves

ÉCAILLES DU CORPS INERMES. LIGNE LATÉRALE A PETITES ÉCAILLES LONGUES SANS AIGUILLON. DEUXIÈME RAYON DE LA DORSALE A PEINE PLUS LONG QUE LES AUTRES. ÉPINE CORACOÏDIENNE COURTE.

DIAGNOSE — *Corps*. Allongé, épaissi en avant. Hauteur du corps un sixième de la longueur totale. Longueur 40 à 60 centimètres.

Couleur. Rouge teinté de brun ou de vert dorsalement, devenant orangé sur les côtés, puis jaune d'or et enfin blanc rosé sur la face ventrale. Dorsales, anale et ventrales : rouge orange tacheté de bleu noirâtre. Pectorales bleu noir avec bandes ou taches oranges et bleues, une grosse tache noire sur la face interne. Caudale gris et rouge sang.

Tête. Large, aplatie, profil antérieur allongé. Diamètre de l'œil compris deux fois dans la longueur du museau, une fois et demie dans l'espace postorbitaire. Espace interorbitaire profondément concave et égal au diamètre de l'œil.

Ornementation de la tête. Plus accusée chez le jeune que chez l'adulte. Plaques dermiques sous-orbitaires striées de proéminences granuleuses s'irradiant autour d'un point placé à la base du sous-orbitaire. Angle antéro-supérieur de l'orbite garni de denticulations. Préorbitaire granuleux, strié chez le jeune. Angle du préopercule aigu, garni de deux épines chez le jeune. Epine suprascapulaire courte et pointue. Epine coracoïdienne courte et aiguë. Chez le jeune deux épines occipitales.

Dents. Présentes sur les mâchoires et le vomer, absentes sur palatin et langue.

Nageoires. Le sillon des dorsales est garni de 24 à 25 plaques marginales lisses, munies d'une petite épine légèrement redressée. Première dorsale aux rayons lisses, le deuxième à peine plus long que le premier. Pectorales longues, dépassant l'anus, toujours plus longues que les ventrales. Anale émarginée.

Ligne latérale. 70 écailles, inermes et petites.

Vessie natale. Grande, trilobée chez l'adulte.

Rayons branchiostèges. VII. Dorsales : première : 8/9. Deuxième : 16/17. Pectorales : 10/11+III. Ventrales : 1/5. Anale : 14/16. Caudale : 12.

Ligne latérale : 70. Vertèbres : 15 + 19. Cœcums pyloriques : 10.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET BIOLOGIE — Méditerranée. Atlantique : de la Norvège à la côte Sud d'Afrique. (*Trigla Capensis*. Valenciennes et Steindachner). Fréquent en Manche et autour des Iles Britanniques. Signalé dans le Skagerrack et le Cattegat, jusqu'au Sund. Poisson de profondeur recherché par les chalutiers et de plus en plus rare du fait de l'intensification du chalutage. Rencontré occasionnellement à la surface. Ponte de Janvier à Juillet dans les régions septentrionales. Jeunes abondants dans la zone côtière en Manche (fonds de sable et herbiers).

SYNONYMIE, BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE OUVRAGES PRINCIPAUX

1554. — RONDELET. De Pisc. mar. X. P. 396.

1832. — BONAPARTE. Faun. Italica. Pesci. Fasc. X. P. 52, Pl. 94, fig. 1.

1881. — MOREAU. Poiss. France. T. II. P. 284.

1908. — ROULE. Triglides. Méditer. Arch. Zool. Exp. Gén. Sér. IV. T. 9.

Trigla hirundo.

1758. — LINNÉ. Syst. Nat. I. P. 497.

1783. — BLOCH. Naturg. Fisch. Deutsch. T. II. P. 126. Pl. 60.

1829. — CUVIER ET VALENCIENNES. Hist. Nat. Poissons. T. IV. P. 40.

1893. — CANU. *Trigla hirundo*. (Tombe). Ann. Stat. Aquic. Boulogne. Vol. II.

1924. — H. HERTLING. Ueber den grauen und roten Knurrhahn. Deut. Wiss. Mer. Hel.

Trigla lucerna.

1858. — LINNÉ. Syst. Nat. Ed. X. Tome I. P. 301.

1892. — SMITT. Scand. Fish. P. 200. Fig. 57.

1913. — LE DANOIS. Pois. Manche Occid. P. 74. Fig. 109-114-119-122-123.

Trigla cuculus.

1768. — BRUNNICHUS. Ichth. Mass. P. 77.

Trigla laevis.

1809. — MONTAGU. Mém. Wern. Nat. Hist. Vol. II. P. 435.

Trigla corvus.

Risso. H. Natur. Eur. Mérid. 3. P. 398.

Trigla pœcilopectera (jeune).

1829. — CUVIER ET VALENCIENNES. I. c. P. 47.

Trigla nigripes.

1863. — MALM. Förh Skand. Naturf. M. P. 410.