



**EXPLICATION DES FIGURES**

*Fig. 1. Trigla obscura. Vu de profil. F. DAY. Fish. Gr. Brit. Irel., pl. XXVII.*

**TRIGLÆ LAEVES**

Ecailles du corps inermes. Ligne latérale à grandes écailles. Deuxième rayon de la première dorsale sétiforme et plus long que les autres. Epine coracoïdienne peu développée.

**DIAGNOSE** — *Corps* : Allongé, conique, la hauteur étant comprise environ six fois 1/2 dans la longueur totale, celle-ci atteignant de 20 à 30 centimètres à l'état adulte. Ecailles petites et lisses. Pas de replis transverses.

*Couleur* : Dos et flancs rougeâtres. Ventre gris blanc. Dorsales : gris rougeâtre. Pectorales : bleues plus ou moins foncé. Ventrals et anale : blanc.

*Tête* : Longueur de la tête comprise quatre fois et demi dans la longueur totale. Museau peu allongé, légèrement échancré et peu denticulé. Le profil antérieur est très incliné et très légèrement convexe. Diamètre de l'œil est égal au 2/3 de la longueur du museau et au double de l'espace interorbitaire qui est légèrement concave.

*Ornementation de la tête* : Variable suivant l'âge et plus accusée chez le jeune. Plaques dermiques garnies de sillons étoilés, ou de tubercules. Préorbitaire garni d'une forte épine et de plusieurs petites. Angle du préopercule avec deux petites épines. Les épines operculaires, scapulaires, suprascapulaires et coracoïdiennes sont peu développées.

*Dents* : Villiformes sur les maxillaires et le vomer. Pas de dents palatines.

*Nageoires* : Deux dorsales. Le second rayon de la première dorsale est très allongé, sétiforme, peut atteindre le 1/3 environ de la longueur totale du poisson. Le troisième est presque aussi long, plus grand que le premier. Le sillon des dorsales est bordé par 27-28 plaques marginales garnies de petites épines dirigées postérieurement. Pectorales atteignant l'origine de la deuxième dorsale ou le troisième rayon de l'anale. Ventrals aussi longues que les pectorales. Caudale légèrement échancrée.

*Ligne latérale* : 68 à 70 écailles différentes de celles qui recouvrent le corps. Inermes, striées et échancrées sur leur bord libre.

*Vessie natatoire* : Grande, ovale et à parois minces. Parfois légèrement échancrée en avant.

Rayons branchiostèges : VII. Dorsales : 1<sup>re</sup> : 10 2<sup>e</sup> : 17/18.

Pectorales : 10+III. Ventrales : I+5. Anale : 17/18.

Caudale : 11/12. Ligne latérale : 68/70. Vertèbres : 12+23.

Cœcums pyloriques : 8.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET BIOLOGIE**— Commun dans Méditerranée et Adriatique.

Océan : Golfe de Gascogne. Plus rare au Nord de la Loire. Assez rare sans être exceptionnel en Manche.

### SYNONYMIE, ICONOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE

#### OUVRAGES PRINCIPAUX

##### *Trigla obscura.*

1754. — LINNAEUS, Mus. Adolphi Friederici. Stockh. II, p. 94.  
1801. — BLOCH & SCHNEIDER, Systema Ichthyologiae, Berlin, p. 16.  
1832-41. — BONAPARTE, Iconografia della fauna Italica. T. III. Pesci, p. 102, fig.  
1867. — STEINDACHNER, Ich. Span. u. Port, p. 87.  
1860. — GUNTHER, Cat. Fish Brit. Mus. II, p. 210.  
1908. — L. ROULE, Notes ichthyologiques sur les Triglides de la Méditerranée. Arch. zool. Exp. Gén. 1908. (4), vol. IX.

##### *Trigla cuculus.*

1554. — RONDELET, Pisc. Mac. Lib. X. Cap. 2 (*Cuculus*).  
1638. — ALDROVANDUS, De Pisc. Libri V. II. C 4, p. 38 (*Cuculus*).  
1820. — RISSO, Hist. Nat. Europe MÉR. III, p. 394 (*Trigla cuculus*).

##### *Trigla lucerna.*

1768. — BRUNNICH, Ichth. Massiliensis, p. 76.  
1810. — RISSO, Ichth. Nice, p. 209.  
1829. — CUVIER & VALENCIENNES, Hist. Nat. Poissons. T. IV, p. 72, pl. LXXII.  
1841. — YARRELL, Hist. Brit. Fishes. Vol. I, p. 63, fig. II, p. 39.  
1850. — GUICHENOT, Explor. Algérie. Poissons, p. 40.  
1865. — COUCH, Fish. Brit. Isl. II, p. 33, pl. LXX (*Lanthorn Gurnard*).

JEAN LE GALL 1931.